

## BiokaURTICA príbalový leták

Prírodný produkt obsahujúci extrakt zo žihľavy dvojdomej (*Urtica dioica*).

**POPIS:** BiokaURTICA je vodný extrakt zo žihľavy dvojdomoj (*URTICA DIOICA*), ktorý prirodzeným spôsobom aktivuje odolnosť rastlín proti patogénnym hubám a baktériám. Taktiež pôsobí proti žravému a cicavému hmyzu. Extrakt treba vždy aplikovať preventívne od jari do jesene v intervale 7 až 14 dní. Za vlhkého počasia alebo silného napadnutia sa odporúčajú kratšie intervaly postreku. Do postreku odporúčame použiť ako zmáčadlo 0,1 % BorOil.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Insekticíd a akaricíd					
Plodina	Škodca	Rast, Fáza, Sezóna	Počet aplikácií	Aplikačný interval	Koncentrácia
Fazuľa, zemiaky*, ruže**	Rôzne druhy vošiek. Roztočec chmelový	od BBCH 89 od BBCH49* začiatok leta**	1-5	7-15 dní	0,4-0,5 %
Šalát, kapustovitá zelenina, repka olejná, horčica, reďkovka	Rôzne druhy vošiek Blýskavec repkový Molička kapustová	Skorá jar BBCH49	1-6	7-15 dní	0,4-0,5 %
Ovocné a okrasné stromy	Rôzne druhy vošiek Obalovač jablčný	Jar, Leto Od BBCH87	1-5	7-15 dní	0,4-0,5 %
Vinič	Roztočec chmelový	Jar, Leto Od BBCH89	1-6	7-15 dní	0,4-0,5 %

---

## BiokaURTICA príbalový leták

Prírodný produkt obsahujúci extrakt zo žihľavy dvojdomoj (*Urtica dioica*).

**POPIS:** BiokaURTICA je vodný extrakt zo žihľavy dvojdomoj (*URTICA DIOICA*), ktorý prirodzeným spôsobom aktivuje odolnosť rastlín proti patogénnym hubám a baktériám. Taktiež pôsobí proti žravému a cicavému hmyzu. Extrakt treba vždy aplikovať preventívne od jari do jesene v intervale 7 až 14 dní. Za vlhkého počasia alebo silného napadnutia sa odporúčajú kratšie intervaly postreku. Do postreku odporúčame použiť ako zmáčadlo 0,1 % BorOil.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Insekticíd a akaricíd					
Plodina	Škodca	Rast, Fáza, Sezóna	Počet aplikácií	Aplikačný interval	Koncentrácia
Fazuľa, zemiaky*, ruže**	Rôzne druhy vošiek. Roztočec chmelový	od BBCH 89 od BBCH49* začiatok leta**	1-5	7-15 dní	0,4-0,5 %
Šalát, kapustovitá zelenina, repka olejná, horčica, reďkovka	Rôzne druhy vošiek Blýskavec repkový Molička kapustová	Skorá jar BBCH49	1-6	7-15 dní	0,4-0,5 %
Ovocné a okrasné stromy	Rôzne druhy vošiek Obalovač jablčný	Jar, Leto Od BBCH87	1-5	7-15 dní	0,4-0,5 %
Vinič	Roztočec chmelový	Jar, Leto Od BBCH89	1-6	7-15 dní	0,4-0,5 %

Fungicíd					
Plodina	Choroby	Rast, Fáza, Sezóna	Počet aplikácií	Aplikačný interval	Koncentrácia
Zelenina: Uhorky Cukety Tekvicovitá zelenina Rajčiaky Zemiaky*	Múčnatka <i>Erysiphepolyg oni</i> <i>Podosphaera xanthii</i> <i>Alternaria alternata f. sp cucurbitate</i> <i>Alternaria solani</i> <i>Septoria lycopersis</i> <i>Phytophthora infestans</i> *	od BBCH 89 od BBCH49*	1-6	7-15 dní	0,2-0,4 %
Kapustovitá zelenina	<i>Alternaria sp</i>	Skorá jar BBCH49	1-6	7-15 dní	0,2-0,4 %
Ovocné stromy	<i>Hrdza listov</i> <i>Alternaria alternata</i> <i>Hniloby hnedé</i> <i>Monilinia laxata</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Rhizopus stolonifer</i>	Jar, Leto Od BBCH87	1-6	7-15 dní	0,2-0,5 %
Vinič	Peronospora	Jar, Leto Od BBCH89	1-6	7-15 dní	0,2-0,5 %

**PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:** Najlepšie výsledky sa získajú ak sa dodrží doporučená dávka a aplikácia sa uskutoční na obe strany listu. Aplikácia na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete. Produkt vlejte do postrekovača naplneného vodou do ½ objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie. **Kompatibilita:** V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním. Nemiešajte s kyslými produktami. **SKLADOVANIE:** Produkt skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých a vetrateľných miestach pri teplote od +5 do +25°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti produktu (v originálnych neporušených obaloch) 3 roky od dátumu výroby.

Fungicíd					
Plodina	Choroby	Rast, Fáza, Sezóna	Počet aplikácií	Aplikačný interval	Koncentrácia
Zelenina: Uhorky Cukety Tekvicovitá zelenina Rajčiaky Zemiaky*	Múčnatka <i>Erysiphepolyg oni</i> <i>Podosphaera xanthii</i> <i>Alternaria alternata f. sp cucurbitate</i> <i>Alternaria solani</i> <i>Septoria lycopersis</i> <i>Phytophthora infestans</i> *	od BBCH 89 od BBCH49*	1-6	7-15 dní	0,2-0,4 %
Kapustovitá zelenina	<i>Alternaria sp</i>	Skorá jar BBCH49	1-6	7-15 dní	0,2-0,4 %
Ovocné stromy	<i>Hrdza listov</i> <i>Alternaria alternata</i> <i>Hniloby hnedé</i> <i>Monilinia laxata</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Rhizopus stolonifer</i>	Jar, Leto Od BBCH87	1-6	7-15 dní	0,2-0,5 %
Vinič	Peronospora	Jar, Leto Od BBCH89	1-6	7-15 dní	0,2-0,5 %

**PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:** Najlepšie výsledky sa získajú ak sa dodrží doporučená dávka a aplikácia sa uskutoční na obe strany listu. Aplikácia na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete. Produkt vlejte do postrekovača naplneného vodou do ½ objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie. **Kompatibilita:** V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním. Nemiešajte s kyslými produktami. **SKLADOVANIE:** Produkt skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých a vetrateľných miestach pri teplote od +5 do +25°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti produktu (v originálnych neporušených obaloch) 3 roky od dátumu výroby.